

# ALTISE NOIRE



Adulte



Domages causés aux feuilles

**Nom français :**

Altise noire

**Plantes hôtes :**

*Vaccinium sp.* (bleuet), *Cornus sp.* (cornouiller), *Weigela sp.* (weigela), *Hydrangea sp.* (hydrangée), *Physocarpus sp.* (physocarbe), *Vitis sp.* (vigne), *Parthenocissus sp.* (vigne vierge), *Rubus sp.* (framboisier), *Chelone sp.* (chelone), *Leucanthemum sp.* (marguerite) et *Lythrum sp.* (salicaire)

**Description des dommages :**

Les adultes grignotent le feuillage, créant une criblure des feuilles. Les larves mangent de petites racines, mais ne causent pas de dommages. Les dommages sont d'ordre esthétique.

**Caractéristiques de l'adulte :**

Noir luisant, forme légèrement ovale, 4 mm.

**Caractéristiques de la larve :**

Blanc crème, 3 paires de pattes. Elle mesure environ 6 mm.

**Condition(s) favorable(s) de développement :**

Hiver doux avec sol qui ne gèle pas.

**À surveiller :**

- Tôt au printemps, vérifier la présence des adultes dès le débourrement des plantes hôtes.
- Dépister de préférence par temps chaud et ensoleillé.
- Les insectes bondissent aussitôt qu'ils sont dérangés.

**Lutte préventive :**

- Éviter la présence de mauvaises herbes près des plants.
- Le sarclage mécanique détruirait quelques larves.
- Ne pas laisser la litière de feuilles à la base des plants.

**Si vous croyez être aux prises avec cette infestation, consultez votre jardinerie.**

Une information de votre jardinerie, membre de l'Association québécoise de commercialisation en horticulture ornementale.

