

# CASSIDE DORÉE



<b>Nom français :</b>	Casside dorée
<b>Plante hôte :</b>	<i>Ipomoea</i> sp. (gloire du matin)
<b>Description des dommages :</b>	L'adulte commence par faire des trous de forme ovale sur les feuilles. Lorsque l'infestation est sévère, celles-ci sont entièrement dévorées, laissant seulement les nervures de la feuille. Les dommages sont généralement d'ordre esthétique puisque la casside dorée n'affecte que très rarement la survie du plant affecté.
<b>Caractéristiques de l'adulte :</b>	Petit coléoptère doré de forme arrondie mesurant entre 5 et 8 mm.
<b>Caractéristiques de la larve :</b>	La larve possède un corps plat de couleur variant entre jaune à brun rouge. Elle mesure environ 7mm.
<b>Condition(s) favorable(s) de développement :</b>	Présence abondante de mauvaises herbes (liseron, chardon, plantain et ortie) près des plantes hôtes.
<b>À surveiller :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Au printemps, surveiller les œufs de couleur beige ou blanc sous les feuilles, pondus en masse grâce à une substance gélatineuse qui les lie ensemble.</li><li>• Les adultes apparaissent en force lors du début de la floraison du pissenlit.</li></ul>
<b>Lutte préventive :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Éliminer les herbes indésirables qui peuvent servir de plantes hôtes autour des plates-bandes.</li><li>• Éviter tout stress aux plantes car la casside préfère les plantes affaiblies.</li><li>• Éviter de replanter les plantes sensibles au même endroit chaque année.</li><li>• Détruire les œufs sous le feuillage en les écrasant avec les doigts.</li><li>• Éliminer les feuilles présentant des excréments noirs luisants pour détruire les larves qui s'y cachent.</li></ul>

**Si vous croyez être aux prises avec cette infestation, consultez votre jardinerie.**

Une information de votre jardinerie, membre de l'Association québécoise de commercialisation en horticulture ornementale.